

Vogelgrippe

Desinfektionsmaßnahmen - Empfehlung

Waschen und Desinfizieren der Hände unmittelbar vor Betreten des Stalls:

Zur Händedesinfektion sind handelsübliche Desinfektionsmittel geeignet, die z.B. mit "begrenzt viruzid", "viruzid", "wirksam gegen behüllte Viren" gekennzeichnet sind. Solche Händedesinfektionsmittel können in Apotheken, Landmärkten, Drogeriemärkten erworben werden.

Errichtung von Desinfektionsmatten oder -wannen vor dem Stalleingang:

Hier soll das Schuhwerk, welches außerhalb des Stalls getragen wird, desinfiziert werden. Es können hierzu handelsübliche Mörtelkübel in ausreichender Größe oder haushaltsübliche Wannen, die mit Desinfektionsmittel gefüllt werden, genutzt werden. Alternativ kann eine mit Desinfektionsmittel getränkte Schaumstoffmatte mit einer wasserundurchlässigen Unterlage verwendet werden. Geeignete

Desinfektionsmittel sind in der Sparte "behüllte Viren/7b" in der DVG

Desinfektionsmittelliste für Handelspräparate

<http://www.desinfektiondvg.de/fileadmin/>

FG_Desinfektion/Dokumente/Listen/Tierhaltungsbereich/DVGDesinfektionsmittelliste_TH.pdf) einsehbar.

Desinfektionsmittel können bei einem praktizierenden Tierarzt erworben werden.

Bei niedrigen Temperaturen sind nur bestimmte Mittel funktionsfähig. Peressigsäurehaltige Handelspräparate können auch bei Temperaturen zwischen 0° und 10°C angewendet werden.

Ameisensäure und andere org. Säuren (Zitronensäure u. a.) sind bei Temperaturen unter 10°C nicht anwendbar.

Ggf. muss eine temperaturabhängige Konzentrationserhöhung erfolgen. Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind stets die produktspezifischen Anwendungs- sowie Entsorgungshinweise zu beachten. Ggf. ist der Hoftierarzt als Berater hinzuzuziehen.

Reinigung und Desinfektion der eingesetzten Geräte und Installationen nach jeder Ein- oder Ausstallung von Geflügel

Nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gründlich zu reinigen und zu desinfizieren.

Hierzu sind die Hinweise zu Desinfektionsmitteln gemäß Punkt 1 zu beachten. Die Verwendung eines Hilfsmittels (z. B. Rückenspritze o.ä.) hilft beim flächenmäßigen Auftragen des Desinfektionsmittels.

Reinigung und Desinfektion der Transportmittel für Geflügel nach dem Einsatz

Dazu zählen Viehtransportfahrzeuge, Anhänger, Kisten, Käfige und Behältnisse, die nach jeder Verwendung unverzüglich zu reinigen und zu desinfizieren sind.

Unter [DVG | Desinfektion in der Veterinärmedizin | Ausschuss der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V.: Desinfektion bei Geflügelpest \(Aviärer Influenza\) \(desinfektion-dvg.de\)](#) finden Sie eine Erklärung der DVG **gerade zur Anwendung von Desinfektionsmitteln, die gegen Aviäre Influenza-Viren wirken:**

Sie müssten bei der Eingabe in Drop-down „Wirkungsbereich“ unter [DVG | Desinfektion in der Veterinärmedizin | Ausschuss der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V.: Desinfektionsmittel Tierhaltung \(desinfektion-dvg.de\)](#) „behüllte Viren“ anklicken.

Dann kommt eine ganze Liste von geeigneten Desinfektionsmitteln, z.B. Wofasteril SC super, Venno Vet, ... Venno Vet gibt es auch schon in kleineren Gebinden (1l ca. 35€).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Veterinärbehörde